

P-327

Vaccination grippe et COVID-19 : qui, quand, comment, en même temps ?

Marie Mongazon-Cazavet¹, Ayoub Boukhlal², Yousra Bellaoui², Jean-Luc Gaudry³, Emmanuelle Blanc², Cyrille Pouyaban²

¹Département Health Economics and Outcomes Research, Pfizer France, Paris, France
²Département Medical, Primary Care Business Unit, Pfizer France, Paris, France
³Directeur de projets, Tekkare, Montrouge, France
Adresse email + téléphone du 1^{er} auteur

Introduction

La grippe (GRI) et la COVID-19 (COV) sont responsables chaque année d’un lourd fardeau pour les patients et la société. Depuis la pandémie de COV, la Haute Autorité de Santé a émis plusieurs recommandations rendant éligible aux vaccinations GRI et COV des profils de personnes sensiblement comparables tout en recommandant la co-administration des deux vaccinations (GRICOV) pendant la campagne hivernale. Il apparait intéressant de faire le point sur l’application de ces recommandations et de mieux connaître le profil des personnes vaccinées GRI et/ou COV.

Objectifs

L’objectif principal est de décrire la population selon le nombre d'individus, leurs caractéristiques et comorbidités selon le statut vaccinal durant la campagne de vaccination automnale 2022–2023 en France. Les objectifs secondaires visent à décrire les modalités de vaccination et les schémas d’exposition, notamment la coadministration et à évaluer l’utilisation des ressources de soins hospitaliers et ambulatoires liées aux maladies COVID-19 et grippe chez les patients hospitalisés jusqu’à la fin du suivi en septembre 2023.

Méthodes


Une étude de cohorte rétrospective descriptive a été réalisée sur un échantillon représentant 2 % de la population présente dans la base du Système National des Données de Santé. Elle a porté sur la période octobre 2022 à mars 2023 et a inclus toutes les personnes de plus de 6 mois vaccinées durant cet intervalle. Leurs caractéristiques, comorbidités et consommations de soins ont été recueillies sur les cinq années précédant l’étude, jusqu’au début de la campagne hivernale 2023/2024.

Résultats

- Sur la période d’étude, respectivement 46 632, 123 782 et 80 243 personnes ont reçu un vaccin COV, GRI et GRICOV.
- L’âge moyen était comparable entre les groupes GRI et GRICOV (71 et 74 ans) et nettement plus élevé que celui du groupe COV (57 ans).
- Seulement 12% des femmes enceintes et 62% des personnes ≥65ans ont reçu l’une ou l’autre des vaccinations.
- Environ 90% des personnes vaccinées des groupes GRI et GRICOV avaient ≥1 comorbidités contre 63% pour le groupe COV.
- Maladies cardiométaboliques, neurodégénératives/psychiatriques et respiratoires étaient les 3 comorbidités les plus fréquemment retrouvées dans chacun des groupes

Groupe	Cardiométaboliques (%)	Neuro/Psychiatriques (%)	Respiratoires (%)
Gri	77	78	41
GRICOV	42	24	21
COV	41	31	12

Répartition des modalités de co-administration des vaccins dans le groupe GRICOV



Conclusion

Les résultats observés sont cohérents avec ceux présentés par Santé Publique France. Le profil de personnes vaccinées contre la COV est différent de celui des personnes vaccinées GRI ou GRICOV. L’application des recommandations en vigueur doit encore être améliorée, d’autant plus dans le cadre de la prochaine arrivée de vaccins combinés Grippe/COVID-19.